



ФЕРМЕНТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Фактор Killer	Кинетика на АФ	Оптимална T°C на АФ	Устойчивост към етанол	Хранителни нужди	Продуциране на ЛК	Продуциране на глицерол	Продуциране на SO ₂	Продуциране на H ₂ S	Продуциране на пирогроздена киселина	Продуциране на ацеталдехид
S. cerevisiae	Killer K2	Бърза	18–32°C	14,0 % vol	Слаби	Слабо	Средно	Слабо	Слабо	Средно	Средно

*Много добро имплантиране



УПОТРЕБА

Разпръснете активните сухи дрожди (АСД) в 10 пъти по-голямо количество смес от вода и мъст в равни пропорции при температура между 35 и 40°C.

Пример: 500 g АСД в смес от 2,5 L вода и 2,5 L мъст при 37°C. Оставете да престои 20 минути, след което внимателно хомогенизирайте закваската. Ако температурната разлика между закваската и мъстта не надвишава 10°C, вложете директно закваската в мъстта. В противен случай удвоете обема на закваската с мъст, изчакайте 10 минути, хомогенизирайте внимателно и вложете в мъстта.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Продукт за енологична и изключително професионална употреба. Да се използва в съответствие с действащото законодателство.



РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТИ

СЕНЗОРЕН ПРОФИЛ В

резултат на програма за селекция в лозята, SO.FRUITY® е избрана заради своите органолептични свойства, типични за големите вина от Beaujolais. Позволява получаването на обогатени и плодови червени вина с нюанси на вишна, гренадин и цветисти тонове.

Сравнение на органолептичните профили на 3 вина, произведени с дрожди, използвани в лозята на Beaujolais. Опит Sicarex Beaujolais върху AOC Beaujolais Village Blacé



Информацията, представена по-горе, отразява текущото състояние на нашите познания. Тя се предоставя без ангажимент или гаранция, тъй като условията на употреба са извън нашия контрол. Тя не освобождава потребителя от спазването на действащото законодателство и изискванията за безопасност. Настоящият документ е собственост на SOFRALAB и не може да бъде променян без негово съгласие.