



NUTRICELL® FML

Органичен хранителен продукт за активиране на малолактичната ферментация



Специално формулиран за малолактична ферментация

Намалява латентната фаза

Ограничава образуването на летлива киселинност



ЕНОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ

- Инактивирани сухи дрожди, селектирани, поради съдържанието си на аминокиселини, пептиди, витамини и минерали.
- Ускорява протичането на малолактичната ферментация.
- Ограничава органолептичните отклонения.



ДОЗА

Препоръчителна доза: 20 до 30 g/hL



РАЗФАСОВКИ



1 KG
5 KG



СЪХРАНЕНИЕ

Пълна, неотворена опаковка: на сухо място, защитено от светлина и без странични миризми. Да се пази от замръзване.
Отворена опаковка: да се използва бързо.

Информацията, представена по-горе, отразява текущото състояние на нашите познания. Тя се предоставя без ангажимент или гаранция, тъй като условията на употреба са извън нашия контрол. Тя не освобождава потребителя от спазването на действащото законодателство и изискванията за безопасност. Настоящият документ е собственост на SOFRALAB и не може да бъде променен без негово съгласие.



УПОТРЕБА


Разтворете NUTRICELL® FML в 10 пъти неговото тегло вода или мът (1 kg в 10 L).

Предварително разреждане и хомогенизация

Внасяне



Хомогенизирайте добре!
Внасяне в мът по време на
засяването с дрожди



**Вложете в съда по време на
засяването с дрожди**

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА:

Продукт за енологична и изключително професионална употреба. Да се използва в съответствие с действащото законодателство.

ЗНАЕТЕ ЛИ ТОВА? ХРАНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА *OENOCOCCUS OENI*

Азот

Само органична форма
(аминокиселини,
пептиди)

Не се използва
азот в
амониева
форма, тъй
като не се
усвоява от
бактериите

Витамини

Тиамин (B1),
рибофлавин
(B2), ниацин
(B3),
пантотенова
киселина (B5),
биотин (B8),
фолиева
киселина (B9)

Въглерод

Необходим е под
1 g/L еквивалент
глюкоза

Способен да
метаболизира:
глюкоза, фруктоза,
арабиноза, трехалоза
и да хидролизира
полизахариди

Минерали

Mg, Mn & K